



CONSORCI
HOSPITAL GENERAL
UNIVERSITARI
VALÈNCIA

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UNA CRISIS CONVULSIVA EN LA ESCUELA



Nombre: _____ SIP _____

Centro Escolar: _____ Curso: _____

Padres/tutor _____ Teléfono: _____

Centro de Salud: _____

FOTO

PASO 1: EVALUAR Y ASISTIR ¡HELP!

H= HORA Reconocer la crisis y mirar la hora. Cronometrar el tiempo de duración de la crisis.



E= EVITAR que se golpee en la cabeza. EVITAR sujetar al niño con fuerza. EVITAR abrir y manipular la boca. EVITAR Introducir objetos en la boca.

L= LATERALIZAR al paciente.

P= PEDIR AYUDA



PASO 2: LLAMAR ¡112!


PASO 3: TRATAR

Si persiste la crisis y han pasado 3-5 minutos, administrar uno de los fármacos disponibles:

Buccolam®



Stesolid®



Primero quitar el tapón de la jeringa precargada.
Administrar VIA BUCAL entre dientes y mejilla

Azul: de 1 a 5 años. 5 mg.
Morado: de 5 a 10 años. 7,5 mg.
Naranja: de 10 a 18 años. 10 mg.

Primero romper la lengüeta de la punta.

Administrar VIA RECTAL.

Dosis:
Menos de 20 kg: 5 mg
Más de 20 kg: 10 mg

LLAMADA DE EMERGENCIA: 112

1. Mantenga al niño en posición de seguridad.
2. **NO DEJAR NUNCA AL NIÑO SOLO.**
3. Llame a Urgencias (Tel: 112) y comunique que es una Crisis convulsiva.
4. Llame a los padres y tutores legales _____
5. Aun cuando el padre/representante legal no pueda ser contactado, no dude en administrar la medicación (deber de socorro) y/o llevar al niño a un Servicio médico.